

## Crissier 012-01



### Emplacement

<b>Commune:</b> 1023 Crissier	<b>District</b> Lausanne	VD
<b>Coordonnées Est</b> 533.885	<b>Altitude</b> 465	
<b>Coordonnées Nord</b> 156.009		

### Descriptions générales

<b>Couronne:</b> Sphérique	<b>Propriétaire:</b>
<b>Circonférence:</b> 200 cm	<b>Age estimé:</b> 68.5
<b>Origine:</b>	<b>Variété:</b>
<b>Remarques:</b> Verger Ramification dès la base	


### Descriptions phénologiques

	2000	2001	2002	
<b>Date débourrement</b>	25.04.00	01.05.01	23.04.02	assez tardif
<b>Date floraison mâle</b>	07.05.00			assez tardif
<b>Date floraison femelle</b>	17.05.00			moyen
<b>Date maturité noix</b>	03.10.00	17.09.01	23.09.02	tardif
<b>Dichogamie</b>				protandre

### Descriptions sanitaire

<b>Anthracnose</b>	Sain
<b>Bactériose</b>	Faible
<b>Erinose</b>	Sain
<b>Carpocapse</b>	Sain

### Descriptions de la récolte



#### Tailles moyennes des noix [cm]

Hauteur: 3.88  
 Largeur: 3.22  
 Epaisseur: 3.32

#### Production

2000 Faible à Abondante  
 2001 Abondante  
 2002 Abondante  
 Moyenne: Faible à Abondante

#### Rendements moyens [%]

Commercial 40.  
 Génétique: 36

### Descriptions de la noix

**Forme de face:** Trapézoïdale large  
**Forme de profil:** Trapézoïdale large  
**Homogénéité de la forme:** Assez homogène

**Soudure de la valve:** 9  
**Epaisseur coque:** 6  
**Facilité d'énoisage:** 7

#### Répartition des calibres [%]

<28m 6.42  
 28-30mm 24.7  
 30-32mm 34.6  
 32-34mm 24.0  
 34-36mm 10.1  
 36-38mm 0  
 >38mm 0

**Défauts lignification [%]:** 0

**Appréciation de la noix:** 7

### Descriptions des cerneaux

**Goût:** 6

#### Répartition des déchets [%du poids]

Vide: 0  
 Moisi: 0  
 Flétris: 9.9  
 % Déchet total 9.9

#### Répartition des couleurs de cerneaux [% du poids]

Citronnés: 0  
 Arlequin foncé: 0  
 Arlequin clair: 50.  
 Blond: 49.

**Appréciation du cerneau:** 7