

Nax 614-01



Emplacement

| | | | | |
|------------------|----------|----------|--------|----|
| Commune: | 1973 Nax | District | Hérens | VS |
| Coordonnées Est | 598.851 | Altitude | 1162 | |
| Coordonnées Nord | 118.914 | | | |

Descriptions générales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Couronne: | Sphérique | Propriétaire: | Tante de J.-L. Spring |
| Circonférence: | 91 cm | Age estimé: | 18.4 |
| Origine: | De semis | Variété: | |
| Remarques: | Verger 2 fourches: 87 et 91 cm | | |


Descriptions phénologiques

| | 2000 | 2001 | 2002 | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| Date débourrement | | 27.04.01 | 11.04.02 | moyen |
| Date floraison mâle | | | 09.05.02 | moyen |
| Date floraison femelle | | 16.05.01 | 21.05.02 | moyen |
| Date maturité noix | 02.10.00 | | 15.10.02 | excessivement tardif |
| Dichogamie | | | | très protandre |

Descriptions sanitaire

| | |
|-------------|------|
| Anthracnose | Sain |
| Bactériose | Sain |
| Erinose | Sain |
| Carpocapse | Sain |

Descriptions de la récolte

 Bijoux


Tailles moyennes
des noix [cm]

Hauteur:

Largeur:

Epaisseur:

Production

2000 Médiocre

2001

2002 Faible

Moyenne: Faible

Rendements moyens [%]

Commercial 30.

Génétique: 32

Descriptions de la noix

Forme de face:

Cordiforme

Forme de profil:

Elliptique large

Homogénéité de la forme:

Homogène

Soudure de la valve: 6

Epaisseur coque: 8

Facilité d'énosage: 7

Répartition des calibres [%]

<28m 7.12

28-30mm 15.3

30-32mm 7.71

32-34mm 33.4

34-36mm 28.9

36-38mm 7.41

>38mm 0

Défauts lignification [%]: 2.50

Appréciation de la noix: 7.

Descriptions des cerneaux

Goût: 5

Répartition des déchets [%du poids]

Vide: 0

Moisi: 16.

Flétris: 2.9

% Déchet total 19.

Répartition des couleurs
de cerneaux [% du poids]

Citronnés: 35.

Arlequin foncé: 21.

Arlequin clair: 0

Blond: 43.

Appréciation du cerneau: 5